

~~XI 12 S 2~~
Mourisco branco
6 Rg 11 s 86-90

Mourisco branco

COMITE TECHNIQUE PERMANENT
DE LA SELECTION
DES PLANTES CULTIVEES

XI. 12 S 2 ⊕

SECTION VIGNE

très enroulé

Mourisco branco
XI 12 S 2

C.T.P.S.

Mourisco branco

XI 12 S 2.

7 Mai 1974 feuilles ≠

peut être la s 2

vérifier au printemps
si s 1 et s 2 st ≠ ?

14/6/86 pas d'impureté
dans ce clone.






v4




v4




v4



DESIGNATION Mourisco branco

CLOS XI PLANCHE 12 RANG S Souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 14.8.73

Date de Maturité : 17.9.73 x +5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P 10 : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17x17 ?

disc. - sph. ? - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 2
s3 f
s4 3
s5 f

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Mourisco branco

CLOS XI PLANCHE 12 RANG S Souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - c
Millerandage : 0
Date de Véraison : 2-8-74
Date de Maturation : 10-9-74 x +4
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M 15 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M 17x15 - P
dis. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
s2 3
s3 }
s4 } f
s5 }

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Mourisco branco .

CLOS XI PLANCHE 12 RANG S Souche 2

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - ~~couché~~

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 22.9.75 x +6

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 13 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18x17

disc. - Sph. - ell. - leg ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 4
s3 f
s4 f
s5 f

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1967
Emplacement ..XI 12 S2.............. Désignation ..Mourisco branco...

	Nombre total	DATES							
		8.3	13.3						
1 ~~3~~	4	1	4	x					
2 8									
3				Dle 10/3/67					
4					-3				
5									

Année / 1968
Emplacement ..XI . 12 . S2.............. Désignation ..Mourisco branco

	Nombre total	DATES					
		25.3	29.3.				
1	4	0	3 x				
~~2~~							
~~3~~							
4	~~3~~	3 -	3 x				
~~5~~							

Dle 27-3-68 = +3

Année / 1969

Emplacement ....XI 1252........ Désignation ..Mourisco branco

	Nombre total	Dates					
		24.3.	27.3				
1	6	0	1				
2	f						
3							
4	4	4	4				
~~5~~							

I le 27.3.69

+4

Désignation : Mourisco branco
Emplacement : XI 12, S2 A.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo - 1967

2

Désignation : Mourisco branco

Emplacement : XI 12, S2 A.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

Désignation : Mourisco branco
Emplacement : XI 12 S2 1.1

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) léger - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Mourisco branco

Désignation :

Emplacement : XI 12 52 'a.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabro 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.)

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement : Mourisco Branco

Désignation : XI 12 52 s.1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 14 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 16 a 15 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 69

Mourisco branco

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : XI 12 S 2 s.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).
assez

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10...... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo72

Nº d'ordre : 2473 - 01 Désignation : Mourisco branco

Origine :

Emplacement : XI - 12 - 52

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3. ☿

9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L .... (1) - (2).

11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - (7) - (9.)

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3.)

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3.)

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 XX L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8.)

Domergue 71